

A mennyiségi vadkár értékelésének általános irányelvei a faállományokban/szaporítóanyagban	
<i>A mennyiségi vadkár a főállományt alkotó egyedek és/vagy a szaporítóanyag megsemmisülése, esetleg olyan mérvű károsodása, amely állomány szinten csak az egyed pótlásával hozható helyre.</i>	
1	<i>Makkfelszedés állomány alatt.</i> Természetes felújításokban B, CS, KTT, KST, MOT, VT fafajoknál. A mellékelt táblázatok a kárforma becslésére nem alkalmasak. A bizonyítottságot vizsgálni kell! A kártípus védett kontroll mintaterületek és a károsított területek összehasonlításával becsülhető. Feltételezzük, hogy a felújítás még újabb, követő makktermésre alapozható.
2	<i>Makkfelszedés végvágás után.</i> Elsősorban KTT, KST, CS, VT állományok "makkra vágásakor" fordul elő. A kár bizonyítottságát vizsgálni szükséges! A mellékelt táblázatok a kárforma becslésére csak korlátozottan alkalmasak. A kár a pótlásra használt szaporítóanyag (mag és/vagy csemete) helyszínre szállított + a vetés (ültetés) költségértékével egyenlő. A felújítás az anyaállomány újabb makktermésére már nem alapozható.
3	<i>Makk kitúrása, elfogyasztása makkvetéses erdősítésekben.</i> CS, KTT, KST, VT, KD, FD fafajoknál. A kár értékelhető a mellékelt táblázatok alapján, de amennyiben a helyreállítás nem oldható meg makkvetéssel, akkor a mesterséges és csemetével végzett erdőfelújítás számsorait kell alapul venni (kár = pótlási költségérték).
4	<i>Ismétlődő, vagy egyszeri, jelentős vezérhajtás + oldalhajtás károk, ahol az egyed elpusztul, vagy tűrevágással sem hozható helyre.</i> Elsősorban a fenyők mennyiségi kárformája, de előfordul fiatal korfokú lombos fiatalosokban is, ahol a tűrevágás után a sarjadzás és növekedés már jelentősen akadályozott, így az egyed főállomány alkotóként a továbbiakban már nem vehető figyelembe. A természetes felújításokban és mag(makk)vetéses erdősítésekben, amennyiben az nem vethető újra, úgy a mesterséges csemetével végzett erdősítés értékeit kell alapul venni (kár = pótlási költségérték).
5	<i>Törzsön, kéreg rágási és hántási, korona törési károk.</i> A kárforma mennyiségi kárként főként a fenyőkben jelentkezik, ha a károsítás az egyed pusztulásához vezet, illetve a minőséget, vagy a növekedést hosszú távon jelentősen lerontja. Lombos állományokban a tűrevágás esetleg 15 éves korig alkalmazható kárfelszámolási művelet. Idősebb korban (kor > 5 év) a tűrevágás során minimum 0,1 ha összefüggő terület javasolt.